

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบบี
ในประชากรตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนภาพร บุตรจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบบี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เพราะทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การสำรวจความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังและไวรัสตับอักเสบบีดำเนินการในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเจาะเลือดตรวจหา HBsAg (การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง) และตรวจหา HCV Ab (การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี) พบว่าระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการอายุระหว่าง ๑๕ – ๗๔ ปี จำนวน ๑,๐๘๔ ราย พบการติดเชื้อตับอักเสบบีเรื้อรัง ๔๔ ราย คิดเป็นความชุกร้อยละ ๐.๖ โดยเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น พบความชุกในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ ๐.๙ ส่วนในผู้ชายพบความชุกร้อยละ ๐.๖ ส่วนการติดเชื้อตับอักเสบบี พบ ๑๔ ราย คิดเป็นความชุกร้อยละ ๐.๑ ซึ่งพบเฉพาะในกลุ่มอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปเท่านั้น การพบความชุกของการติดเชื้อสูงในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นเป็นประเด็นที่สำคัญในการพิจารณาการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ เพราะทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาทันเวลา เป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อ และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ