

ข้อแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์กับอุบัติการณ์ใหม่...ไวรัสซิกาสำหรับ โรงพยาบาล

การระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในประเทศบราซิลกลางปี 2558 ทำให้เกิดความผิดปกติของบุตรที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ การติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะสำคัญชนิดเดียวกับไวรัสไข้เลือดออกเดงกี และไข้เลือดออกชิคุนกุนยา เชื้อไวรัสสามารถถ่ายทอดเชื้อสู่บุตรได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และสามารถผ่านทางน้ำนมได้ อาการแสดงคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยจะมีไข้ มีผื่นขึ้น ปวดตามข้อ และตาแดง บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ การติดเชื้อไวรัสซิกาอาจทำให้ทารกในครรภ์เสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด มีขนาดศีรษะที่เล็กผิดปกติ (Microcephaly) หรือเสียชีวิตได้

ข้อแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์

1. ป้องกันยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้ามิดชิด อยู่ในมุ้งหรือใช้มุ้งลวด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการมีไข้ มีผื่นขึ้น ปวดตามข้อ และตาแดง บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ ให้รีบมาปรึกษาและพบแพทย์ เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ
3. โรงพยาบาลตรวจเลือดหาการติดเชื้อไวรัสซิกาให้แก่หญิงตั้งครรภ์ เพื่อยืนยันการติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน และสามารถส่งเลือดตรวจได้ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ
4. ส่งต่อหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ที่เสี่ยง เพื่อตรวจอัลตราซาวด์ หากภาวะ (Microcephaly) ขณะอยู่ในครรภ์



ซิกาฟรีเวอร์ป้องกันได้

ด้วยความปรารถนาดี
จาก...กรมอนามัย

ซิก้าฟรีเวอร์ป้องกันได้

หญิงตั้งครรภ์ควรรู้

ติดต่อโดยยุ่งลายชนิดเดียวกับไวรัสไข้เลือดออก

อาการแสดงคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยจะมีไข้ มีผื่นขึ้น ปวดตามข้อ และตาแดง บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ

เชื้อผ่านสูบบุหรี่ได้ ตั้งแต่ครรภ์ และผ่านทางน้ำนม อาจทำให้ทารกในครรภ์เสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด มีขนาดศีรษะที่เล็กผิดปกติ

ข้อแนะนำ

1. ป้องกันยุงกัด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย
2. ตรวจสอบเลือดหาการติดเชื้อไวรัสซิก้า เพื่อยืนยันการติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน
3. หญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกที่มีอาการ ควรได้รับคำแนะนำตรวจอัลตราซาว เพื่อดูทารกในครรภ์

ด้วยความปรารถนาดี
จาก...กรมอนามัย

