



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



ผลกระทบบของ กัญชา

ต่อหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ห้ามสูบหรือรับประทาน
อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา

สาร THC ในกัญชาสามารถส่งผ่านทางรกและน้ำนมแม่ได้
และสะสมอยู่ในน้ำนมแม่ได้นานตั้งแต่ 6 วัน - 6 สัปดาห์

ผลกระทบต่อมารดา

- เกิดความผิดปกติทางอารมณ์
- มีอาการประสาทหลอน

ผลกระทบต่อทารก

- ทำให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า
มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย
ส่งผลให้ต้องรักษาในโรงพยาบาลนาน
- ในระยะยาว จะมีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทและสมอง
เกิดโรคสมาธิสั้น



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ