



ขั้นตอนการวัดสายตาในเด็กนักเรียน

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

Banphaeo General Eye Hospital



01

วัดสายตาเบื้องต้น ด้วย Snellen Chart

02

พบผิดปกติ นำเด็กมาวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตา(Auto Refraction)

03

ดูมุมตาเด็ก (โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) และหยอดยาขยายม่านตา

04

วัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาซ้ำ (Auto Refraction)

05

นัดวันเวลากับทางโรงเรียนเพื่อวัดสายตาประกอบแว่นที่ถูกต้อง
และเลือกกรอบแว่น

กรณีที่ 1 คัดกรองวัดสายตาเบื้องต้นแล้วพบเด็กที่ผิดปกติ มีขั้นตอนดังนี้

01

พบผิดปกติ นำเด็กมาวัดสายตา
ด้วยเครื่องวัดสายตา(Auto Refraction)



02

ดูมุมตาเด็ก (โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)
และหยอดยาขยายม่านตา



03

วัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาซ้ำ
(Auto Refraction)

04

นัดวันเวลากับทางโรงเรียนหลังจากหยอดยา 3 วัน
เพื่อหาค่าสายตาประกอบแว่นที่ถูกต้องและเลือกกรอบแว่น

กรณีที่ 2 ยังไม่ได้วัดสายตาเบื้องต้น

01 วัดสายตาเบื้องต้นด้วย Snellen Chart



02 พบผิดปกติ นำเด็กมาวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตา(Auto Refraction)



03 ดูมุมตาเด็ก (โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) และหยอดยาขยายม่านตา



04 วัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาซ้ำ (Auto Refraction)

05 นัดวันเวลากับทางโรงเรียนหลังจากหยอดยา 3 วัน เพื่อหาค่าสายตาประกอบแว่นที่ถูกต้อง และเลือกกรอบแว่น



รายงานโครงการเด็กไทยสายตาดี 2564 พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ต.ค.64 - มี.ค.65

แบบสรุปการคัดกรองสายตานักเรียน ป.1-ป.6		
ข้อมูล	จำนวน	ร้อยละ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด	5705	100
จำนวนนักเรียนที่ตรวจจสายตา	5675	99.47
พบปัญหาสายตา	48	0.85
ได้รับแว่น	38	79.17