



การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด

กลุ่มปกติ



เลี่ยง

- การเข้าใกล้ผู้คน
- การสัมผัสใบหน้า
- การใช้ของร่วมกับผู้อื่น

ลด

- การแพร่เชื้อโดยสวมหน้ากากผ้า และล้างมือให้สะอาด

ดูแล

- รับประทานอาหารสุกใหม่
- หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม ควรพบรีบพบแพทย์
- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1- 2 เมตร
- สามารถฝากครรภ์ได้ตามนัด

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

จัดทำเมื่อ 3 เมษายน 2563



1422
สายด่วน

ออกแบบโดย : Wasitpon Tangsathaponpan



การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด

กลุ่มสัมผัสเสี่ยง



แยกตัวเองออกจากครอบครัว
และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

กรณีครบกำหนดนัดฝากครรภ์
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
เพื่อพิจารณาเลื่อนการฝากครรภ์
และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

กรณีเจ็บครรภ์คลอด ต้องไปโรง
พยาบาลทันทีและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
ทราบว่าอยู่ระหว่างสังเกตอาการ

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

จัดทำเมื่อ 3 เมษายน 2563



1422
สายด่วน



การดูแลทารกแรกเกิด

กรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยติดเชื้อและติดเชื้อ **COVID 19**

บุคลากรทางแพทย์ แจ้งข้อมูลความเสี่ยง และ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการแยกแม่กับลูก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แม่เข้าใจ และเป็นผู้ตัดสินใจ

ยังไม่มีหลักฐานการติดต่อผ่าน
ทางรก หรือ ผ่านทาง**น้ำนม**



แยกการกอดจากการกอื่น
และต้องสังเกตอาการจนครบ **14 วัน**

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

จัดทำเมื่อ 3 เมษายน 2563



1422
สายด่วน

ออกแบบโดย : Wasitpon Tangsathaponpan