



สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ข้อมูลระหว่าง 27 ธันวาคม 2563 – 28 เมษายน 2564



สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย



จากรายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 481
วันที่ 28 เมษายน 2564 พบว่า


- ผู้ป่วยสะสม 61,699 ราย
- เพศหญิงจำนวน 29,948 ราย
- เด็ก 0-5 ปี จำนวน 707 ราย

*ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 และ data.go.th กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป


รายงานการติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 76 คน

	จำนวน (คน)
การกระจายของผู้ติดเชื้อตามสถานที่รักษา	
สมุทรสาคร	62
ตาก	3
ระยอง	2
กรุงเทพมหานคร	1
เชียงใหม่	1
ชัยภูมิ	1
นครราชสีมา	1
ปทุมธานี	1
ปัตตานี	1
สงขลา	1
สุรินทร์	1
อุดรธานี	1




ข้อมูลทั่วไป

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	1	1.32
20 - 34 ปี	63	82.89
35 ปีขึ้นไป	11	14.47
ไม่ระบุ	1	1.32
สัญชาติ		
ไทย	19	25.00
ต่างด้าว	57	75.00




ข้อมูลการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด 6 สัปดาห์

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ความรุนแรงของอาการ		
ไม่มีอาการ	43	56.58
อาการเล็กน้อย	12	15.79
ปอดอักเสบ แต่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ	21	27.63
ปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ	0	0.00
ขณะตรวจพบเชื้อ		
กำลังตั้งครรภ์	69	90.79
คลอดแล้ว	7	9.21




ข้อมูลการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด 6 สัปดาห์

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุครรภ์ขณะตรวจพบเชื้อ		
ต่ำกว่า 14 สัปดาห์	2	2.63
14 - 27 สัปดาห์	5	6.58
28 - 36 สัปดาห์	17	22.37
37 สัปดาห์ขึ้นไป	45	59.21
ตรวจพบหลังคลอด 6 สัปดาห์	7	9.21
ข้อมูลการคลอด		
ยังไม่คลอด	15	19.74
คลอดแล้ว	61	80.26
ผ่าตัดคลอด (n=61)	22	36.07
คลอดทางช่องคลอด (n=61)	39	63.93




ข้อมูลการติดเชื้อในทารกแรกเกิด

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
อายุครรภ์ขณะคลอด (n=61)		
34 - 36 สัปดาห์	6	9.84
37 สัปดาห์ขึ้นไป	54	88.52
ไม่ระบุ	1	1.64
น้ำหนักแรกเกิด (n=61)		
น้อยกว่า 2,500 กรัม	9	14.75
2,500 กรัมขึ้นไป	52	85.25
Apgar score 1 นาที		
0-3	0	0.00
4-6	0	0.00
7-10	61	100.00




ข้อมูลการติดเชื้อในทารกแรกเกิด

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การติดเชื้อในทารกแรกเกิด		
ไม่ติดเชื้อ	53	86.89
ติดเชื้อ	8	13.11
ความรุนแรงของอาการ (n=8)		
ไม่มีอาการ	3	
อาการเล็กน้อย	3	
ปอดอักเสบ	2	
แต่ไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ		
ปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ	0	




ข้อมูลการติดเชื้อในทารกแรกเกิด

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การแยกแม่ลูก		
แม่ – ลูกอยู่ห้องเดียวกัน	4	6.56
แม่ลูกอยู่ห้องเดียวกัน แต่มีการเว้นระยะห่าง 2 เมตร	2	3.28
แยกห้องกัน แต่อยู่ด้วยกันบางเวลา	0	0.00
แยกกันอยู่คนละห้อง	55	90.16
ผู้ดูแล กรณีแยกกันอยู่คนละห้อง (n=55)		
ญาติ	2	3.64
พยาบาล	53	96.36



ข้อมูลการติดเชื้อในหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด

	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การให้นมลูก		
ให้ลูกกินนมจากเต้า	6	9.84
ป้อนน้ำนมแม่โดยให้ผู้ช่วยป้อน	0	0.00
กินนมผสม	48	78.69
กินนมแม่และนมผสม	7	11.48
การจำหน่ายเด็ก		
ยังไม่จำหน่าย	3	4.92
ลูกกลับพร้อมแม่	8	13.11
แยกกันกลับ	50	81.97





ข้อมูลการติดเชื้อในทารกแรกเกิด

ลำดับที่	สถานพยาบาล	วันที่ตรวจพบเชื้อหลังคลอด		ความรุนแรง ของอาการ	การแยกแม่ลูก	การให้นมลูก
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2			
1	รพ.สมุทรสาคร	24 วัน	NA	- ปอดอักเสบ - ติดเชื้อในกระแสเลือด	แม่ – ลูก อยู่ห้องเดียวกัน	กินนมจากเต้า
2	รพ.สมุทรสาคร	24 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง	มีอาการเล็กน้อย มีไข้ หายใจเหนื่อย	แม่ – ลูกแยกกัน อยู่คนละห้อง	นมผสม
3	รพ.ปทุมธานี	8 วัน	17 วัน	ไม่มีอาการ	แม่ – ลูก อยู่ห้องเดียวกัน	กินนมจากเต้า
4	รพ.แม่สอด	24 ชั่วโมง	72 ชั่วโมง	ไม่มีอาการ	แม่ – ลูกแยกกัน อยู่คนละห้อง	นมผสม



ข้อมูลการติดเชื้อในทารกแรกเกิด

ลำดับที่	สถานพยาบาล	วันที่ตรวจพบเชื้อหลังคลอด		ความรุนแรง ของอาการ	การแยกแม่ลูก	การให้นมลูก
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2			
5	รพ.บ้านแพ้ว	24 ชั่วโมง	NA	อาการเล็กน้อย	แม่ – ลูกแยกกัน อยู่คนละห้อง	นมผสม
6	รพ.บ้านแพ้ว	24 ชั่วโมง	NA	อาการเล็กน้อย	แม่ – ลูกแยกกัน อยู่คนละห้อง	นมผสม
7	รพ.ครบุรี	3 วัน	4 วัน	อาการเล็กน้อย	แม่ – ลูก อยู่ห้องเดียวกัน	กินนมจากเต้า
8	รพ.ชัยภูมิ	24 ชั่วโมง	96 ชั่วโมง	ไม่มีอาการ	แม่ – ลูกแยกกัน อยู่คนละห้อง	นมผสม



สรุปสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดภายใน 6 สัปดาห์และทารกแรกเกิด

1. หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ (56.58%) พบปอดอักเสบ (27.63%) แต่ไม่มีรายใดต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
2. หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่ คลอดขณะมีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ขึ้นไป (88.52%) อัตราการผ่าตัดคลอด 36.07%
3. พบทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย 14.75% และคลอดก่อนกำหนด 9.84%
4. พบทารกติดเชื้อ 8 ราย มีอาการปอดอักเสบ 1 ราย ซึ่งติดเชื้อขณะอายุ 24 วัน
5. การให้นมลูก พบว่ามีการแยกแม่ลูก 90.16% และพบทารกได้กินนมแม่จากเต้าเพียง 9.84%

Google Form รายงานหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อ COVID-19



<https://forms.gle/VhpdCVfvT8ziAu2YA>



กรมอนามัย
Department of Health

THANK YOU

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย